



JUHISED ESMAABIKS JA MEDITSIINITÖÖTAJATELE

Kõik kuuma bituumeniga töötavad isikud peaksid neid soovitusi tundma, et anda põletusohvritele esmaabi. Käesolev dokument peab olema patsiendiga kaasas ja pandud nähtavasse kohta enne patsiendi viimist arsti juurde või haiglasse.

BITUUMENIT EI TOHI PÜÜDA PÕLETUSKOHALT EEMALDADA

>> ESMAABI

Kui õnnetus on juhtunud, tuleb kahjustatud piirkond viivitamatult maha jahutada, et vältida kuumenemist, mis põhjustab edasist kahjustust. Põletuskohta tuleb loputada külma veega vähemalt kümme minutit ja silmi vähemalt 5 minutit. Tuleb vältida siiski keha alajahtumist. Bituumenit ei tohi püüda põletuskohalt eemaldada.

>> EDASINE RAVI, ESMAABI JA MEDITSIINILINE HOOLDUS

Bituumenikiht jääb tugevasti naha külge kinni ning seda ei tohi püüda eemaldada mujal kui ainult meditsiinasutuses arsti järelevalve all. Jahtunud bituumen moodustab põletuskohal vett mitteläbilaskva steriilse kihi, mis ei lase põletuskohal kuivada. Bituumeni eemaldamine haavalt võib nahka veelgi kahjustada, mis toob kaasa tüsistuste tekkimise võimaluse. Bituumeni eemaldamine teise astme põletushaavalt selle ravimiseks loob lisaks võimaluse, et infektsioon või kuivamine muudavad haava sügavamaks.



>> TEISE ASTME PÕLETUSED

Bituumen tuleb jätta põletuskohale ja katta see parafiinitatud marlisidemega või parafiini sisaldava põletusevastase salviga, nt Flammazine (hõbesulfadiasiin) Sellisel ravivõttel on bituumenit pehmendav toime, mis võimaldab bituumeni mõne päeva pärast ettevaatlikult eemaldada. Naha epiteelkoe loomuliku taastumise tulemusena koorub sellele jäänud bituumen aja jooksul ise maha.

>> KOLMANDA ASTME PÕLETUSED

Tuleb vältida bituumeni kiiret eemaldamist, juhul kui ei kavatseta haava sügavuse ja asukoha tõttu kasutada kõigepealt kirurgilist ravi. Sellistel juhtudel on bituumen kõige parem eemaldada operatsioonisaalis teisest kuni viienda päevani pärast põletuse tekkimist. Kahe päeva pärast on kapillaarvereringe tavaliselt taastunud ja haavakoht selline, et spetsialist saab määrata, kui sügavale põletus on tunginud. Enne kuendat päeva ei teki tavaliselt lisaprobleeme, nagu näiteks infektsioonid. Siiski on oluline alustada ravi parafiinil põhinevate ainetega kohe õnnetusepäeval, et kergendada kirurgilise operatsiooni ajal bituumeni eemaldamist.

>> RINGPÕLETUSED

Kui jäse või muu kehaosa on kuuma bituumeniga täielikult ümbritsetud, võib jahtunud ja kõvastunud bituumen põhjustada žgutaolise efekti. Sellise juhtumi korral tuleb külgekleepunud bituumen pehmendada ja/või tükkidena eemaldada, et see ei takistaks vereringet.

>> SILMAPÕLETUSED

Bituumenit ei tohiks püüda eemaldada meditsiinilise väljaõppeta isik. Kannatanu tuleb viivitamatult viia eriarsti juurde läbivaatusele ja ravile.

Tehtud on arvestatavaid pingutusi, et tagada selles kirjutises sisalduva teabe täpsus ja usaldusväärsus. Eurobitume ega ükskõik milline muu Eurobitume'is osalev ettevõtte ei vastuta mis tahes kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis tuleneb käesoleva teabe kasutamisest.

Eurobitume avaldab tänu kaastöö eest dr M. J. Hoekstrale ja dr M. H. E. Hermannsile Punase Risti haigla põletusosakonnast, Beverwijk, Holland.

