



AJÁNLÁSOK AZ ELSŐ SEGÉLYHEZ ÉS ÚTMUTATÁS A MEDIKAI SZEMÉLYZET SZÁMÁRA

A forró bitumennel dolgozó minden személynek ismernie kell az alábbi ajánlásokat, hogy első segélyt tudjon nyújtani a leforrázások áldozatainak. E dokumentum kísérfje el a pácienset, és jól látható módon legyen elhelyezve a páciens orvoshoz vagy kórházba szállítása előtt.

NE PRÓBÁLD ELTÁVOLÍTANI A BITUMENT A LEFORRÁZOTT SZEMÉLYRŐL A BALESET SZÍNHELYÉN

>> ELSŐ SEGÉLY

Ha baleset történt, a test leforrázott részét/a leforrázás területét azonnal le kell hűteni, hogy a forró anyag ne okozzon további károsodásokat. A leforrázás helyét legalább 10 percen át hideg vízbe kell meríteni, és legalább 5 percig a szem leforrázása esetén. A hipotermiát (túlzott lehűtés) el kell kerülni. Semmilyen módon nem szabad megkísérelni a bitumen eltávolítását a leforrázott testfelületről.

>> TOVÁBBI GYÓGYÍTÁS, ELSŐ SEGÉLY ÉS ORVOSI GONDOZÁS

A bitumen réteg szorosan rátapad a bőrre, és az eltávolítását csak a kórházban, orvos felügyelete mellett szabad megkísérelni. A hideg bitumen a leforrázott helyen vízhatlan, steril réteget alkot, amely megátolja a seb kiszáradását. Ha a bitumen el lett távolítva a sebről, a bőr valószínűleg tovább károsodik, komplikációk előidézésének lehetőségével.

Ezen felül, a másodfokú leforrázás feltárása fertőzést idézhet elő, vagy kiszáráthatja a sebet, ami annak elmélyülését okozza.



>> MÁSODFOKÚ LEFORRÁZÁSOK

A bitumen réteget rajta kell hagyni a seben, és lefedni parafinban vagy leforrázási sebek parafinos kenőcsében beáztatott gézzel, ilyen kenőcs pl. a Flammazine (Sulfadiazinum argentum). Az ilyen gyógyítás meg fogja puhítani a bitument, ami lehetővé teszi annak óvatos eltávolítását néhány nap múlva. A bőr fedőréteg természetes regenerálódása folytán a bitumen maradékai idővel lehámlanak a seb felületéről.

>> HARMADFOKÚ LEFORRÁZÁSOK

El kell kerülni a bitumen aktív eltávolítását, kivéve, ha a seb helyére és mélységére való tekintettel sebészeti gyógyítás kerül megfontolásra. Ilyen esetekben a bitumen réteg eltávolítási műveletét a legjobb egy operációs teremben elvégezni, a leforrázás megtörténte utáni második naptól az ötödik napig terjedő időben. A második napig általában helyreáll a keringés a hajszálerekben, a seb felülete olyan állapotban van, hogy egy specialista sikerrel értékelni képes a leforrázás mélységét. A hatodik nap előtt általában nem lép fel semmiféle olyan komplikáció, mint a fertőzés, amellyel harcolni kell. Azonban kulcsfontosságú a gyógyítás megkezdése parafin tartalmú szerekkel – már a baleset bekövetkezésének napjától fogva, ami megkönnyíti a bitumen réteg levételét a sebészeti beavatkozás során.

>> KÖRBEFUTÓ LEFORRÁZÁSOK

Olyan esetben, ha a forró bitumen teljesen körülveszi valamelyik végtagot vagy testrészt, a lehűtött és megkeményedett bitumen szorító kötésként működhet. Ha ilyen szituáció következett be, akkor a feltapadt bitument meg kell puhítani és/vagy leválasztani, a vér áramlás korlátozásának megelőzése céljából.

>> A SZEM LEFORRÁZÁSA

A képzetlen személyzetnek semmilyen módon nem szabad megkísérelnie a bitumen eltávolítását. A páciensét sürgősen speciális orvosi vizsgálatra és megfelelő gyógyításra kell irányítani.

Mindenben törekedtünk arra, hogy az ebben a közleményben közreadott információk a lehető legpontosabbak és szakszerűek legyenek. Azonban sem az Eurobitume, sem pedig az Eurobitume keretében résztvevő más cég nem vállalhat felelősséget semmiféle veszteségért, kárért vagy testi sérülésért, amelyek ezen információk kihasználása folytán keletkeznek.

Az Eurobitume köszönetét fejezi ki M.J. Hoekstra Doktor Úrnak és M.H.E.Hermanns Doktor Úrnak a hollandiai Beverwijk-i Vöröskereszt Kórházból, a jelen tájékoztató kidolgozásában való részvételükért.